

## NCCIT细胞说明书

Cat NO.:GCL-0639

## 售前须知

1.该细胞在运输过程中易脱落，需要按照到货漂浮的方法处理；2.该细胞对温度比较敏感，建议培养基预热处理后再处理细胞；3.同时该细胞对血清要求较高，受血清影响较大；4.细胞在培养过程中存在一定量的漂浮现象，高低密度下培养基都会容易变黄，细胞生长过程中存在漂浮的细胞碎片；5.传代消化时间在3分钟左右，1:2传代，3天左右可以再次传代。建议消化后离心处理再重悬细胞；6.细胞传代时建议更换新的容器培养能减少不贴壁现象发生，建议培养容器用多聚赖氨酸包被处理。

## 基本信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 人畸胎瘤细胞                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 细胞简称      | NCCIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 细胞别称      | NCC-IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 细胞形态      | 上皮细胞样                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 生长特性      | 贴壁细胞                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 培养方案A（默认） | RPMI-1640[GPM150110]+10% FBS[163210]+1% P/S[GPB180120]<br>培养条件：空气，95%；CO <sub>2</sub> ，5%；温度：37℃                                                                                                                                                                                                                |
| 冻存条件      | 55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO<br>液氮                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 传代步骤      | 1.吸出原培养液；<br>2.加入2 mL左右PBS，轻轻晃动培养瓶润洗细胞，吸出PBS丢弃；<br>3.加入1 mL左右0.25%胰蛋白酶溶液（含EDTA），轻轻晃动培养瓶使之浸润所有细胞；<br>4.放入培养箱消化，显微镜下看到细胞块中间的细胞明显变圆有间隙时可终止，全程不要拍打培养瓶；<br>5.加入3 mL含血清的培养基终止消化，吹打细胞使之脱壁并在液体里反复吹打使细胞尽量呈单颗粒细胞的悬浮液；<br>6.收集细胞悬液离心，1200 rpm/min 3分钟，离心完吸出上清丢弃；<br>7.加入新鲜培养基，吹打几下混匀细胞即可，按比例接种到新培养瓶，补足培养基，拧松瓶盖或使用透气瓶盖进行培养。 |
| 消化时间      | 3 min左右                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 传代比例      | 1:2-1:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 换液频率      | 2-3次/周                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 参考资料（来源文献）

|        |                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞背景描述 | NCCIT was established by Shinichi Teshima (National Cancer Institute, Tokyo, Japan) in 1985 from a mediastinal mixed germ cell tumor. |
| 年龄（性别） | Male;24Y                                                                                                                              |
| 组织来源   | 多能性胚胎瘤；畸胎瘤                                                                                                                            |
| 细胞类型   | 肿瘤细胞                                                                                                                                  |

网站: [www.procell.com.cn](http://www.procell.com.cn)

电话:400-999-2100

邮箱:[techsupport@procell.com.cn](mailto:techsupport@procell.com.cn)

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



|        |                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 癌症类型   | 畸胎癌细胞                                                                                                                  |
| 生物安全等级 | BSL-1                                                                                                                  |
| 致瘤性    | Yes, Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with $10^7$ cells. |
| 细胞保藏中心 | ATCC; CRL-2073                                                                                                         |

### 细胞株培养扩增技术服务申明

本公司受贵单位委托，进行细胞株的技术服务工作，并收取相应细胞技术服务费用，细胞株技术服务具体项目清单见订购合同。本公司提供完善的技术支持及售后服务，收到产品后处理方式及售后条款参见《细胞售后条例》。

### 收到常温细胞后如何处理？

(细胞培养详细操作步骤请参照《普诺赛细胞培养操作指南》)

1. 收到常温细胞后及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟代理商或我们联系；对于细胞培养操作及培养注意项有疑问的，可跟我们技术支持交流。

