

NFS-60细胞说明书

Cat NO.:GCL-0301

售前须知

1.该细胞为悬浮细胞，请注意离心收集细胞悬液，请勿直接倒掉细胞培养液；2.该细胞复苏时可以适当增加M-CSF的浓度可以帮助其更好的调整复苏后的状态，且细胞状态变差时也可以增加M-CSF浓度；3.实验室测试发现，该细胞状态较好时，对M-CSF浓度并无要求，最低尝试过不加M-CSF复苏细胞依旧状态良好，状态差时需要增加M-CSF浓度，极限状态下，96孔板中培养，M-CSF浓度增加至120 ng/mL，能够很好的调整细胞活性，使细胞快速增长。

基本信息

中文名称	小鼠髓性白血病淋巴细胞
细胞简称	NFS-60
细胞别称	M-NFS-60; NFS 60; NFS60
细胞形态	淋巴瘤细胞样
生长特性	悬浮细胞
培养方案A (默认)	RPMI-1640[GPM150110]+10 ng/mL M-CSF[GPCK303]+0.05 mM β -mercaptoethanol+10% FBS[163210]+1% P/S[GPB180120] 培养条件: 空气, 95%; CO ₂ , 5%; 温度: 37°C
冻存条件	55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 液氮
传代步骤	可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养，离心转速 参考1200 rpm (250 g左右)，离心3分钟。
传代比例	2×10^5 - 5×10^5 cells/mL
换液频率	2-3次/周

参考资料 (来源文献)

组织来源	骨髓
细胞类型	肿瘤细胞
癌症类型	白血病细胞

细胞株培养扩增技术服务申明

本公司受贵单位委托，进行细胞株的技术服务工作，并收取相应细胞技术服务费用，细胞株技术服务具体项目清单见订购合同。本公司提供完善的技术支持及售后服务，收到产品后处理方式及售后条款参见《细胞售后条例》。

收到常温细胞后如何处理？

(细胞培养详细操作步骤请参照《普诺赛细胞培养操作指南》)

网站: www.procell.com.cn

电话:400-999-2100

邮箱:techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



1. 收到常温细胞后及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟代理商或我们联系；对于细胞培养操作及培养注意项有疑问的，可跟我们技术支持交流。

普诺赛® | Procell system

普诺赛® | Procell system

普诺赛® | Procell system

