

B95-8细胞说明书**Cat NO.:GCL-0476****售前须知**

该细胞为悬浮细胞，请注意离心收集细胞悬液；请勿直接倒掉细胞培养液。细胞会有部分贴壁，贴壁细胞不用胰酶消化，直接吹下收集。

基本信息

| | |
|------------|---|
| 中文名称 | 绒猴EB病毒转化的白细胞 |
| 细胞简称 | B95-8 |
| 细胞别称 | B95.8; B 95.8; B 95-8; B-95-8; B958; GM07404; GM07404D |
| 细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
| 生长特性 | 悬浮细胞 |
| 培养方案A (默认) | RPMI-1640[GPM150110]+10% FBS[163210]+1% P/S[GPB180120] 培养条件：空气，95%；CO ₂ ，5%；温度：37°C |
| 冻存条件 | 55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 液氮 |
| 传代步骤 | 可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养，离心转速 参考1200 rpm (250 g 左右)，离心3分钟。 |
| 传代比例 | 1:2-1:4 |
| 换液频率 | 2-3次/周 |

参考资料（来源文献）

| | |
|---------|---|
| 细胞背景描述 | B95-8细胞源自暴露于人白血球中抽提的EB病毒的绒猴白血球；B95-8细胞是一个连续株，并能释放高滴度的转染EB病毒。B95-8细胞提供EB病毒用于建立人的连续淋巴细胞株。 |
| 倍增时间 | ~40 hours |
| 年龄 (性别) | Female; Age unspecified |
| 组织来源 | 外周血淋巴细胞 |
| 细胞类型 | 转化细胞系 |
| 生物安全等级 | BSL-2 |
| 细胞保藏中心 | DSMZ; ACC-100 ECACC; 85011419 |

细胞株培养扩增技术服务申明

本公司受贵单位委托，进行细胞株的技术服务工作，并收取相应细胞技术服务费用，细胞株技术服务具体项目清单见订购合同。本公司提供完善的技术支持及售后服务，收到产品后处理方式及售后条款参见《细胞售后条例》。

网站: www.procell.com.cn

电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



收到常温细胞后如何处理？

(细胞培养详细操作步骤请参照《[普诺赛细胞培养操作指南](#)》)

1. 收到常温细胞后及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟代理商或我们联系；对于细胞培养操作及培养注意事项有疑问的，可跟我们技术支持交流。

普诺赛® | Procell system

普诺赛® | Procell system

普诺赛® | Procell system

