

## SU-DHL-6细胞说明书

Cat NO.:GCL-0746

## 基本信息

|           |                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 人弥漫性组织淋巴瘤细胞                                                                                                               |
| 细胞简称      | SU-DHL-6                                                                                                                  |
| 细胞别称      | SUDHL6; SuDHL6; SU-DHL6; SUDHL-6; SuDHL-6; Sudhl-6; SUD6; Stanford University-Diffuse Histiocytic Lymphoma-6; DHL-6; DHL6 |
| 细胞形态      | 淋巴瘤细胞样                                                                                                                    |
| 生长特性      | 悬浮细胞                                                                                                                      |
| 培养方案A（默认） | RPMI-1640[GPM150110]+10% FBS[163210]+1% P/S[GPB180120]<br>培养条件：空气，95%；CO <sub>2</sub> ，5%；温度：37℃                          |
| 冻存条件      | 55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO<br>液氮                                                                                           |
| 传代步骤      | 可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养，离心转速 参考1200 rpm（250 g左右），离心3分钟。                                                                  |
| 传代比例      | 1:3-1:4                                                                                                                   |
| 换液频率      | 3-4天/次                                                                                                                    |

## 参考资料（来源文献）

|        |                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞背景描述 | 从一名43岁的B细胞非霍奇金淋巴瘤（B-NHL）患者的腹腔积液中建立，当时描述为弥漫性、混合性小细胞和大细胞型；细胞系携带EZH2 Y641N突变；属于GCB样淋巴瘤亚型（生发中心B细胞）。外显子和RNA序列数据可用（参见参考文献18187和外显子序列和RNA序列） |
| 倍增时间   | ~29 hours                                                                                                                             |
| 年龄（性别） | Female;43Y                                                                                                                            |
| 组织来源   | 腹腔积液                                                                                                                                  |
| 细胞类型   | 肿瘤细胞                                                                                                                                  |
| 癌症类型   | 淋巴瘤细胞                                                                                                                                 |
| 生物安全等级 | BSL-1                                                                                                                                 |
| 基因表达   | monoclonal cytoplasmic immunoglobulin: IgM, lambda light chain                                                                        |
| 细胞保藏中心 | AddexBio; C0003011/4672 ATCC; CRL-2959 CCTCC; GDC0164 DSMZ; ACC-572 KCB; KCB 2016029YJ-A                                              |

## 细胞株培养扩增技术服务申明

本公司受贵单位委托，进行细胞株的技术服务工作，并收取相应细胞技术服务费用，细胞株技术服务具体项目清单见订购合同。本公司提供完善的技术支持及售后服务，收到产品后处理方式及售后条款参见《细胞售后条例》。



## 收到常温细胞后如何处理？

(细胞培养详细操作步骤请参照《普诺赛细胞培养操作指南》)

1. 收到常温细胞后及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟代理商或我们联系；对于细胞培养操作及培养注意项有疑问的，可跟我们技术支持交流。

