

ARH-77细胞说明书

Cat NO.:GCL-0731

基本信息

中文名称	人浆细胞白血病
细胞简称	ARH-77
细胞别称	ARH 77; ARH77
细胞形态	淋巴母细胞样
生长特性	悬浮细胞
培养方案A (默认)	RPMI-1640[GPM150110]+10% FBS[163210]+1% P/S[GPB180120] 培养条件: 空气, 95%; CO ₂ , 5%; 温度: 37°C
冻存条件	55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 液氮
传代步骤	可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养, 离心转速 参考1200 rpm (250 g左右), 离心3分钟。
传代比例	1:2-1:3
换液频率	2-3次/周
收货注意事项	无

参考资料 (来源文献)

细胞背景描述	The ARH-77 cell line was established from the peripheral blood of a patient suffering from IgG plasma cell leukemia. Although established from cells taken from a patient with a plasma cell leukemia, this line has been shown to be an EBV-transformed B lymphoblastoid cell line.
倍增时间	~110.4 hours (PubMed=566614); ~30 hours (DSMZ)
年龄 (性别)	Female;33Y
组织来源	外周血
细胞类型	转化细胞系
生物安全等级	BSL-2
受体表达	unknown
抗原表达	CD11a +; CD19 +; CD20 +; CD28 +; CD38 -; CD49e +
基因表达	unknown
细胞保藏中心	ATCC; CRL-1621 BCRC; 60385 CCTCC; GDC0218

细胞株培养扩增技术服务申明

本公司受贵单位委托, 进行细胞株的技术服务工作, 并收取相应细胞技术服务费用, 细胞株技术服务具体项目清单见订购合同。本公司提供完善的技术支持及售后服务, 收到产品后处理方式及售后条款参见《细胞售后条例》。

网站: www.procell.com.cn

电话:400-999-2100

邮箱:techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



收到常温细胞后如何处理？

(细胞培养详细操作步骤请参照《普诺赛细胞培养操作指南》)

1. 收到常温细胞后及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟代理商或我们联系；对于细胞培养操作及培养注意项有疑问的，可跟我们技术支持交流。

